

Lungefunktionsundersøgelse med medicintest

Formål

Formålet med undersøgelsen er at vurdere lungernes funktion og størrelse. Derudover undersøges effekten af luftvejsudvidende medicin.

Forberedelse

Du SKAL MEGET GERNE medbringe din lungemedicin til undersøgelsen.

For at undersøge effekten af luftvejsudvidende medicin, skal du undgå at tage følgende inhalationsmedicin før undersøgelsen:

36 timer før Spiriva, Onbrez, Seebri, Ultibro, Eklira, Relvar, Anoro, Spiolto, Incruse, Duaklir, Trimbrow, Trelegy, Trixeo, Bevespi, Enerzair, Eklira, Braltus, Aectura

24 timer før Symbicort, Seretide, Innovair, Bufumix, Airflusal, Flutiform, Oxis, Foradil, Serevent, Formo, Duoresp

12 timer før Berodual, Atrovent

6 timer før Bricanyl, Ventoline, Airomir, Airsalb, Buventol, Salamol

Du må gerne tage anden vanlig medicin.

Hvis det ikke er muligt at undvære ovenstående medicin, kontakt venligst lægehuset.

Rygning, mad og drikke

Alkohol og tobak påvirker undersøgelsesresultatet, og må derfor ikke indtages 8 timer før undersøgelsen. Undgå hård fysisk aktivitet 1 time før undersøgelsen.

Du må gerne spise og drikke normalt inden undersøgelsen, dog frarådes større måltider ca. 2 timer før.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår siddende. Du skal kortvarigt puste i et mundstykke, som er forbundet til et apparat, der måler lungernes funktion. Herefter får du din medbragte inhalator, og efter ca. 15 minutter gentages undersøgelsen.

Varighed

Undersøgelsen varer ca 45 minutter